



Título

SÍNDROME SE FOURNIER UMA REVISÃO DA LITERATURA

Autor(es)

- 1 - JAMILSON FERNANDES RODRIGUES
- 2 - EDLIVIA DIAS DE MATTOS
- 3 - EMILIA TAKAHASHI KURIKI
- 4 - NERCÍ APARECIDA DE CASTRO DESTÁCIO
- 5 - SANDRA PONCIANO

Descrição do(s) Autor(es)

- 1 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 2 - DOCENTE UNOPAR
- 3 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 4 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 5 - ALUNO GRAD. UNOPAR

Resumo

A fasciíte necrosante do períneo (síndrome e Fournier) é uma infecção dos tecidos moles, causada por flora bacteriana mista (aeróbios e anaeróbios), é caracterizada por um acometimento da fáscia muscular, trombose venosa de pequenos vasos e supuração. São identificadas causas colo-retais, anorretais e urológicas como fonte da infecção. Vários fatores predisõem na evolução da doença como: diabete tipo II, idade avançada, câncer, trauma, etilismo, desnutrição, obesidade, destacando-se o uso de drogas intravenosas como um novo e crescente fator de risco para fasciíte necrotizante. O rápido diagnóstico é instituirão de antibioticoterapia terapêutica e desbridamento cirúrgico agressivo, depende de suspeitar-se da doença, e os achados iniciais são dor, edema e hiperemia, posteriormente são encontrados equimoses, crepitação, gangrena, necrose com secreção purulenta e odor fétido na pele da área. Conforme a doença progride, tornam-se evidentes a endureção da derme, eritema e, no final, surge necrose da pele. Conclui-se que tratamento com antibióticos de largo espectro e excisão radical de todos os tecidos desvitalizados e infectados, devem ser prontamente iniciados, para minimizar a morbi-mortalidade atribuída a doença. Este estudo objetiva descrever os aspectos etiológico, clínico e tratamento da Síndrome de Fournier. Para tanto foi realizado uma revisão bibliográfica em base de dados com conhecimento teórico-científico, nos acervos da biblioteca da universidade do Norte do Paraná, a metodologia foi um estudo descritivo com abordagem qualitativa, através de revisão literárias dos últimos cinco anos.