



Título

TORCICOLO MUSCULAR CONGÊNITO: RELATO DE DOIS CASOS

Autor(es)

- 1 - CLAUDIA SIMONE MATURANA
- 2 - CAROLINA MARCATO
- 3 - FABIANA SANSON

Descrição do(s) Autor(es)

- 1 - DOCENTE UNOPAR
- 2 - ALUNO GRAD. UNOPAR
- 3 - ALUNO GRAD. UNOPAR

Resumo

O torcicolo muscular congênito (TMC) caracteriza-se pela inclinação lateral da cabeça para o lado do torcicolo e rotação contralateral, devido a má posição uterina. Apresenta fibrose e encurtamento do músculo esternocleidomastóideo. Há uma limitação na rotação cervical para o lado afetado além da linha média. A anomalia pode estar presente desde o nascimento ou manifestar-se entre a segunda e terceira semanas de vida. O presente estudo visa demonstrar a eficácia da intervenção fisioterapêutica precoce nesta afecção. Utilizou-se de um breve levantamento bibliográfico a respeito do tema e acompanhamento de dois bebês do sexo masculino entre 3 e 4 meses de idade, atendidos no ambulatório de pediatria da clínica de fisioterapia da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), no segundo semestre de 2004. O tratamento fisioterapêutico utilizou-se de analgesia local, massoterapia, pompages, alongamentos passivos em diversas posturas e orientações à família, possibilitando melhora clínica e no quadro motor de ambos os pacientes. O tratamento fisioterapêutico precoce e adequado, propicia ao paciente boa evolução motora e ótimo prognóstico.